

**ΚΑΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ****Κάρτα ενημέρωσης ασθενούς**

- Gremer 10 mg
- Gremer 15 mg
- Gremer 20 mg

*\*επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση*

- ◆ **Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή**
- ◆ **Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία**

**Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Gremer (ριβαροξαμπάνη)**

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / καταστάσεις:

**Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε:**

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

**Παρακαλείσθε να ενημερώσετε επίσης:**

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση:

**Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:**

◆ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Gremer.

**Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Gremer.**

- ◆ Το Gremer αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.
- ◆ Το Gremer θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, **μην παραλείψετε καμία δόση.**
- ◆ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Gremer προτού ενημερώσετε τον ιατρό σας καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.
- ◆ Μιλήστε στο ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, προτού ξεκινήσετε το Gremer.
- ◆ Ενημερώστε τους ιατρούς σας ότι λαμβάνετε το Gremer πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

**Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ το ιατρό μου?**

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το Gremer είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Gremer εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε

αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας. Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- ◆ πόνο
- ◆ οίδημα ή δυσφορία
- ◆ πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία
- ◆ ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
- ◆ έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
- ◆ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
- ◆ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

### **Πώς λαμβάνεται το Gremer**

- ◆ Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία, το Gremer
  - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
  - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
  - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό